

## توب فلورا ( TOP FLORA )

### التركيب : PH7days

- نفتالين اسيتاميد 2%

- نفتالين اسيتك اسيد 2%

بيتا نفتوكسي اسيتك اسيد 1%

### الخواص :

1. يحتوي التوب فلورا علي مجموعات نفتالين التي لها القدرة علي زيادة العقد وتثبيت العقد الحديث
2. يعمل علي زيادة نسبة التزهير وزيادة حيوية حبوب اللقاح
3. يعمل توب فلورا علي حدوث اتزان بين المجموع الخضري والزهري
4. يساعد النبات علي الاتزان المائي والاحتفاظ بالماء مما يقلل التأثير بارتفاع درجة الحرارة
5. عند اضافة توب فلورا للعناصر الصغري فانه يزيد من سرعة الاستفادة وجودة المردود
6. يعمل علي التحكم في تخليق الاثيلين داخل النبات بشكل منتظم مع المراحل العمرية مما يؤدي الي عدم الاصابة بالامراض
7. هام مع مجموعة العناصر الصغري في رش التخصيب للمواالح يساعد علي سرعة التخضير وكذلك نتيجة لعدم انتظام درجة الحرارة
8. يستخدم في اثمار الفاكهة والخضروات وكذلك المحاصيل الحقلية والدرنية
9. تنشيط الشعيرات الجذرية
10. لا ينصح بالاستخدام مع حالات الاجهاد الشديدة
11. قابل للخلط مع جميع العناصر الصغري والكبري عدا الكالسيوم بأنواعه
12. يمكن حقنة في السماده بمعدل 300جم/فدان
13. معدل الاستخدام 50سم /100 لتر ماء
14. معدل التسميد الارضي 300 جم / فدان

# Ein Shams

For Agricultural Development

Installation: PH7days

Naphthalene acetamide 2% -

**Naphthalene acetic acid 2% -**

**Beta Naphthoxyacetic Acid 1%**

**:Properties**

**Top Flora contains naphthalene groups that have the ability to increase knots and stabilize new knots**

**It increases the flowering rate and increases the vitality of pollen grains**

**Top Flora works to create a balance between the vegetative system and the flowers**

**It helps the plant maintain water balance and retain water, which reduces the effect of high temperature**

**When Top Flora is added to microelements, it increases the speed of utilization and the quality of the yield**

**It works to control the synthesis of ephelin within the plant on a regular basis with the age stages, which leads to the absence of disease**

**Important with the group of microelements in spraying fertilization on citrus fruits, it helps to speed up greening, as well as a result of temperature irregularities**

**It is used in fruits and vegetables, as well as field and tuber crops**

**Activating root hairs**

**It is not recommended for use in cases of severe stress**

**It can be mixed with all micro and macro elements except calcium**

**Fertilizer can be injected at a rate of 300 g/acre**

**Usage rate: 50 cm/100 liters of water**

**The ground fertilization rate is 300 g/acre**