

سكين زيمو (تركي) (SACEN ZIMO)

مجموعة احماض امينية حرة من اصل نباتي 23.7 %

الخواص:

نظرا لوجود مجموعة الاحماض الامينية الحرة فإن سكين زيمو لة القدرة علي

1. رفع الاجهاد حيث يعمل علي زيادة قدرة النبات علي استعادة نشاطة بعد سرعة حركة العصارة النباتية وزيادة معدل امتصاص العناصر مره اخري
2. يؤدي استخدام مركب سكين زيمو الي زيادة معدل التفريع سواء تفريع جانبي او الاساسي مما يؤدي الي زيادة المجموع الخضري وزيادة معدل عملية البناء الضوئي والتمثيل الغذائي
3. زيادة التفريع وكذلك المجموع الخضري يؤدي بدورة الي زيادة عدد الازهار وزيادة كمية المحصول
4. يعمل مركب سكين زيمو بكفاءة عالية علي المحاصيل المصابة بالصددمات خاصة الناتجة عن الاستخدام الخاطى لمبيدات الحشائش الناتجة عن سوء التهوية في الصوب الزراعية وكذلك زراعات ما تحت الانفاق
5. يعمل مركب سكين زيمو بكفاءة عالية علي المحاصيل الحقلية خاصة مع مركبات الزنك والبورون مما يزيد من وجود حبوب اللقاح وزيادة حجمها
6. لاينصح باستخدام سكين زيمو في الزراعات المصابة بالفطريات خاصة فطر البياض الدقيقي وكذلك اعفان الثمار
7. سكين زيمو يستخدم رش علي محصول الموالح – وكذلك الخضار اثناء زيادة حالة الاجهاد الحراري التي تصاب بها محاصيل الموالح في شهري مايو – يونيو بمعدل 500سم : 1 لتر / 600لتر ماء وكذلك معظم العناصر الصغري لزيادة كفاءتها
8. معدل الاستخدام رش علي المجموع الخضري 500سم : 1 لتر / 600لتر ماء
9. التسميد الارضي 1 : 2 لتر / فدان
10. قابلية الخلط يرجى عمل تجربة قبل الخلط

Ein Shams

For Agricultural Development

Group of free amino acids of plant origin 23.7%

:Properties

Due to the presence of a group of free amino acids, Zymo Skin has the ability ...to

Reducing the stress, as it increases the plant's ability to regain its activity after the rapid movement of plant juices and increases the rate of absorption of .elements again

Using the Skin Zymo compound leads to an increase in the rate of branching, whether lateral or main branching, which leads to an increase in the shoot and .an increase in the rate of photosynthesis and metabolism

Increasing branching as well as the vegetative system leads to an increase in the number of flowers and an increase in the amount of the crop

Skin Zymo compound works with high efficiency on crops affected by shocks, especially resulting from the incorrect use of weed pesticides resulting from poor .ventilation in greenhouses, as well as under tunnel crops

Skin Zymo compound works very efficiently on field crops, especially with zinc and boron compounds, which increases the presence of pollen grains and .increases their size

It is not recommended to use the Zymo knife on crops infected with fungi, .especially powdery mildew and fruit rot

Zymo knife is used to spray citrus crops - as well as vegetables - during the increase in the state of heat stress that citrus crops suffer from in the months of May - June at a rate of 500 cm: 1 liter / 600 liters of water, as well as most .micronutrients, to increase their efficiency

Usage rate: spray on 500cm foliage: 1 liter / 600 liters of water

Ground fertilization 1: 2 liters/acre

Mixability: Please do a test before mixing